

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Publication périodique

DLP 11-10-844267 8

Abonnement

annuel 115,00 F.

Régisseur de Recettes

D.D.A. du Nord

C.C.P. 5704 01 W

Edition de la Station Nord - Pas-de-Calais - Picardie  
Tilloy-les-Mofflaines - B.P. 355 - 62026 ARRAS - Tél. (21) 59.99.35

**Siège de la circonscription**

Cité administrative - 59048 Lille cedex - Tél. (20) 52.00.25

**Antenne régionale picarde :**

(Somme et Oise), 56, rue Jules-Barni - 80040 Amiens - Tél. (22) 92.51.27

(Aisne) Cité administrative - 02016 Laon - Tél. (23) 23.00.41

Permanence les lundi, mercredi et vendredi matin

## SPECIAL NORD - PAS-DE-CALAIS

BULLETIN TECHNIQUE n° 28 du 3 OCTOBRE 1984

### CÉRÉALES

#### AZOTE à L'AUTOMNE

**GASPILLAGE**

=

**POLLUTION**

Du semis au début du printemps, les besoins en azote des céréales sont faibles (10 à 15 unités environ) et le sol à l'automne libère 40 unités à l'hectare.

L'Azote apporté à l'automne sera lessivé durant l'hiver et donc perdu.

L'excès d'azote sensibilise également les céréales au froid et aux maladies et peut être à l'origine de pollution des nappes d'eau par les nitrates.

AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

### COLZA

STADE 2 feuilles vraies pour les cultures les plus avancées (semis de fin août).

#### RAVAGEURS : Grosse Altise


Quelques attaques sur colza au stade 2 feuilles vraies (Cf. schéma).

Actuellement, situation saine pour les semis tardifs.

Préconisations :

- Surveillez les attaques de grosses altises si les températures s'élèvent au-dessus de 20° C. En cas d'intervention, se référer au bulletin n° 26 du 29 août 1984.

- Observez aussi les dégâts de limaces (lacération des feuilles).



feuilles  
vraies

petits trous  
(qq mm)

= morsures  
d'altises

cotylédons

P 90

## DESHERBAGE DE POST-LEVEE :

L'implantation précoce d'adventices peut être préjudiciable. Il est important de contrôler les infestations massives de mauvaises herbes.

Les modalités d'utilisation des différents produits sont résumées dans le tableau ci-après :

Matière active	Spécialités commer.	Dose/ha de spécialité	Observations
carbétamide	LEGURAME PM	3 kg 5 à 6 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depuis le stade 4 F vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de la végétation.</li> <li>Application possible sur sol gelé.</li> <li>BONNE ACTION SUR GRAMINEES. Insuffisante sur dicotylédones.</li> <li>contre chiendent de novembre à fin janvier.</li> </ul>
propyzamide	KERB 50 W	1,5 kg 2 kg 3 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>A partir du stade 3 F vraies du colza (B3) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de la végétation.</li> <li>Application possible sur sol gelé.</li> <li>BONNE ACTION SUR GRAMINEES. Insuf. sur dicot.</li> <li>contre avoine à chapelet.</li> <li>contre chiendent.</li> </ul>
propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>A partir du stade 4 F vraies bien développées, 6<sup>e</sup> f. naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver.</li> <li>BONNE ACTION SUR GRAMINEES.</li> <li>ACTION LIMITANTE SUR SANVES, RAVENELLES</li> </ul>
carbétamide + diméfuron	PRADONE TS *	3,5 kg - 4 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>A partir du stade 6 F vraies (B6) des colzas sains et bien implantés.</li> <li>Application possible sur sol gelé.</li> <li>BONNE ACTION SUR GRAMINEES (dont repous-ses de céréales)</li> <li>UNE ACTION SUR DICOTYLEDONES : efficace sur : veroniques, mours, céraistes, coquelicot irrégulier sur : matricaires, gaillets.</li> </ul>
alloxydine sodium	FERVIN + huile *	0,75 à 1 kg + 3 l d'huile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza</li> <li>de la levée jusqu'au stade début montaison gram.</li> <li>Applic. de préférence sur végét. active (en soirée si temps sec)</li> <li>ACTION ESSENTIELLEMENT SUR GRAMINEES (sauf paturin).</li> <li>1 à 1,25 kg + 3 l d'huile contre graminées vivaces.</li> </ul>
fluazifop - butyl	FUSILADE + ACTIPLUS (huile) *	1 l à 1,25 l 1 l 3 l + 1 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza</li> <li>de la levée jusqu'au st. déb. montaison graminées</li> <li>Applic. de préférence sur végétation active.</li> <li>ACTION ESSENT. SUR GRAM. (sauf paturin)</li> <li>d'Actiplus contre graminées vivaces.</li> </ul>
sethoxydime	FERVINAL *	1,5 à 2 l + 3 l 3 l + 3 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza.</li> <li>De la levée jusqu'au st. déb. mont. des graminées</li> <li>Applic. de préférence sur végét. active (en soirée si tps sec)</li> <li>ACTION ESSENTIELLEMENT SUR GRAMINEES (sauf paturin).</li> <li>d'huile Schering contre graminées vivaces.</li> </ul>

### \* Utilisez la dose faible dans deux cas :

- Si un traitement de prélevée a déjà été réalisé,
- sur des adventices jeunes.

### REMARQUES :

- Pour obtenir une bonne efficacité contre les graminées, ne pas dépasser le stade fin tallage de la graminée.
- Si vous êtes en présence de levées précoces et très importantes de graminées, utilisez des produits sélectifs quel que soit le stade du colza :
  - . FERVIN 0,75 à 1 Kg + 2 ou 3 litres d'huile,
  - . FERVINAL 1,5 à 2 litres + 2 à 3 litres d'huile,
  - . FUSILADE 1 à 1,25 litre + 1 litre d'huile Actiplus Agral.
- Un désherbage antigraminées correct permet aussi de diminuer les populations de pucerons vecteurs de la J.N.O.